

Aloclair®

Gel na dětské dásně

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CZ

Pro úlevu od bolesti při prořezávání prvních zoubků

Určení:

Aloclair® gel na dětské dásně je orální gel, určen pro zmírnění diskomfortu a bolesti spojených s prořezáváním prvních zubů. Aloclair® gel na dětské dásně rychle vytváří ochrannou bariéru, která pomáhá zmírnit bolest a diskomfort při prořezávání prvních zoubků. Aplikátor je opatřen silikonovými štětkami, které jemně masírují bolavé a podrážděné dásně a podpoří tak úlevu od bolesti během aplikace. Díky tomu je použití gelu příjemnější pro děti a jednodušší pro rodiče. Aloclair® gel na dětské dásně má příjemnou banánovou chuť. Aloclair® gel na dětské dásně neobsahuje laktózu, cukr, alkohol a lokální anestetika.

Návod k použití:

Odšroubujte uzávěr, vytlačte množství gelu o velikosti hrášku a držte tubu stlačenou. Naneste gel na postiženou oblast a jemně aplikátorem masírujte dásně. Při opětovné aplikaci před použitím prostředku odstraňte čistýma suchýma rukama zaschlé zbytky z aplikátoru. Vytvoření ochranného filmu a prodloužení doby úlevy od bolesti u dětí podpoříte tak, že gel aplikujete nejlépe po jídle nebo před spaním. Používejte dle potřeby 3-4x denně. Po každém použití uzavřete šroubovací víčko aplikátoru. Aloclair® gel na dětské dásně je vhodný pro použití u dětí starších 3 měsíců.

Mějte na paměti, že každé dítě je jiné a i k prořezávání zubů může docházet u každého dítěte trochu jinak. Zde je obvyklé schéma prořezávání zubů.



- A** 5 – 7 měsíc
Jako první se prořezávají dolní řezáky, tzv. jedničky
- B** 6 – 8 měsíc
Následují horní přední řezáky
- C** 9 – 11 měsíc
Druhé horní řezáky, tzv. dvojky

- D** 10 – 12 měsíc
Druhé spodní řezáky
- E** 12 – 16 měsíc
Se objevují první stoličky
- F** 16 – 20 měsíc
Rostou špičky
- G** 20 – 30 měsíc
Se prořezávají druhé stoličky

Složení:

Voda, PVP (12%), maltodextrín, propylenglykol, PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej, extrakt z listů aloe barbadensis, extrakt z šafránu setého, xanthanová guma, aroma, sorban draselný, benzoát sodný, hyaluronát sodný (0,1%), xylitol, sodná sůl EDTA, cetylpyridiniumchlorid, kyselina glycyrrhetinová.

Kontraindikace, varování a bezpečnostní upozornění:

Pro vyloučení rizika křížové kontaminace aplikátoru a gelu používejte vždy otevřenou tubu Aloclair® gel na dětské dásně pouze u jednoho pacienta. Použití Aloclair® gel na dětské dásně je kontraindikováno u pacientů se známou přecitlivělostí na kteroukoliv složku přípravku. Nepoužívejte, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo kojíte. Uchovávejte mimo dosah dětí! **Přípravek by měla aplikovat dospělá osoba. UPOZORNĚNÍ:** Výrobek není hračka! **NIKDY** ho nenechávejte dětem v ruce. Předějete tak riziku možného udušení. Před použitím zkontrolujte, zda prostředek není poškozen nebo nejeví známky používání. V průběhu aplikace věnujte pozornost jednotlivým částem aplikátoru a zkontrolujte, zda nedošlo k jejich náhodnému uvolnění. V takových případech přestaňte přípravek používat. Nesnažte se znovu sestavit oddělenou část. Nepoužívejte, pokud je tuba otevřená nebo poškozená. Jakékoliv závažné nežádoucí účinky nebo kvalitativní nedostatky přípravku by měly být nahlášeny výrobcí. K tomuto účelu použijte emailovou adresu pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Závažné nežádoucí účinky, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním přípravku by měly být nahlášeny také Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Obsah: 10ml e tuba. Uchovávejte při teplotě mezi 5°C až 25°C. Ukončete používání přípravku, jakmile je obsah tuby vypotřebován. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Aloclair®, Alliance a související prostředky jsou registrované ochranné známky společnosti Alliance Pharmaceuticals Limited.



Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road, Chippenham,
Wiltshire SN15 2BB, Velká Británie



Distributor v ČR:
NextForce a.s., Pardubická 528,
537 01 Chrudim, Česká republika



CE 1282



Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 X0CT, Irsko



www.alliancepharmaceuticals.com



TR3203184
Rev 1: 2024-07

Aloclair®

Gél na detské ďasná

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

SK

Na úľavu od bolesti pri prerezávaní prvých zúbkov


Určené použitie:

Aloclair® gél na detské ďasná je určený na zmiernenie nepohodlia a bolesti v ústnej dutine pri prerezávaní prvých zúbkov. Obsahuje zložky, ktoré pomáhajú zmierniť bolesť a začervenanie v postihnutých oblastiach. Aloclair® gél na detské ďasná rýchlo vytvorí neviditeľný film, ktorý pomáha chrániť ďasná pred bolesťou a nepohodlím spojeným s prerezávaním zúbkov. Obsahuje zložky, ktoré pomáhajú zmierniť bolesť a začervenanie v postihnutých oblastiach. Aplikátor je vybavený silikónovými štetinkami, ktoré jemne masirujú boľavé a podráždené ďasná a môžu tak poskytnúť dočasnú úľavu od bolesti počas aplikácie. Vďaka tomu je používanie gélu pre deti príjemnejšie a pre rodičov jednoduchšie. Aloclair® gél na detské ďasná má príjemnú banánovú príchuť. Aloclair® gél na detské ďasná neobsahuje laktózu, cukor, alkohol a lokálne anestetiká.

Návod na použitie:

Odskrutkujte uzáver, vytlačte množstvo gélu veľkosti hrášku a tubu držte stlačenú. Prípravok naneste na postihnuté miesto a aplikátorom jemne masirujte ďasná. Pri opakovanom nanášaní (pred použitím výrobku) odstráňte všetky zaschnuté zvyšky z aplikátora čistými suchými rukami. U dojčiat používajte najlepšie po jedle a pred spaním, aby ste podporili tvorbu ochranného filmu a aby ste u dieťaťa predĺžili úľavu od bolesti. Používajte podľa potreby 3 – 4x denne. Po každom použití nasadte späť uzáver aplikátora. Aloclair® gél na detské ďasná je vhodný pre deti staršie ako 3 mesiace.

Majte na pamäti, že každé dieťa je iné a prerezávanie zubov môže u každého dieťaťa prebiehať trochu inak. Tu je uvedený zvyčajný priebeh prerezávania zúbkov.



- A** 5 – 7 mesiacov
Ako prvé sa zvyčajne prerezávajú
dolné predné zuby (rezáky)
- B** 6 – 8 mesiacov
Prerezávajú sa horné predné zuby (rezáky)
- C** 9 – 11 mesiacov
Prerezávajú sa horné bočné rezáky po
oboch stranách horných predných zubov

- D** 10 – 12 mesiacov
Po oboch stranách dolných predných
zubov sa prerezávajú dolné bočné rezáky
- E** 12 – 16 mesiacov
Prerezávajú sa zuby stoličky (zadné zuby)
- F** 16 – 20 mesiacov
Prerezávajú sa očné zúbky
- G** 20 – 30 mesiacov
Prerezávajú sa druhé stoličky (zadné zuby)

Zloženie:

Voda, PVP (12 %), maltodextrín, propylénglykol, PEG-40 hydrogenovaný ricínový olej, extrakt z listov aloe pravej, šafrán siaty, xantánová guma, príchuť, sorban draselný, benzoan sodný, sodná soľ kyseliny hyalurónovej (0,1 %), xylitol, disodná soľ EDTA, cetylpiridíniumchlorid, kyselina glycyrrhetínová.

Kontraindikácie, varovania a bezpečnostné upozornenia:

Pre vylúčenie rizika kontaminácie aplikátora a gélu používajte tubu Aloclair® gél na detské ďasná vždy iba u jedného pacienta.

Použitie Aloclair® gél na detské ďasná je kontraindikované u pacientov so známou precitlivenosťou na ktorúkoľvek zložku prípravku. Nepoužívajte, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo dojčíte. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prípravok má aplikovať iba dospelá osoba. UPOZORNENIE: Tento prípravok nie je hračka! **NIKDY** nenechávajte v rukách dieťaťa. Predídete tak riziku možného udusenía. Pred použitím skontrolujte, či prípravok nie je poškodený alebo nemá známky opotrebenia. Počas aplikácie venujte pozornosť jednotlivým častiam aplikátora a skontrolujte, či sa náhodou neuvoľnili. V týchto prípadoch prestaňte prípravok používať. Nepokúšajte sa znovu pripojiť oddelenú časť. Nepoužívajte, ak je prípravok otvorený alebo poškodený. Akékoľvek závažné vedľajšie účinky alebo nedostatky v kvalite výrobku je potrebné nahlásiť výrobcovi. Na tento účel použite e-mailovú adresu pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Závažné zhoršenie zdravotného stavu, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto výrobkom, sa má nahlásiť aj Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

Obsah: 10ml e tuba. Uchovávajte pri teplote 5 °C – 25 °C. Po spotrebovaní obsahu tuby prestaňte výrobok používať. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti.

Aloclair®, Alliance a súvisiace pomôcky sú registrované ochranné známky spoločnosti Alliance Pharmaceuticals Limited.

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road, Chippenham,
Wiltshire SN15 2BB, Spojené kráľovstvo

 Distribútor v SR:
NextForce a.s., Pardubická 528,
537 01 Chrudim, Česká republika

  1282

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 X0CT, Írsko

 Zdravotnícka pomôcka
www.alliancepharmaceuticals.com



020780
Rev 1: 2024-07