

Vartojimo nurodymai



Anaftin® purškalas

„Anaftin“® purškalas padeda kontroliuoti mažų burnos pakenkimų sukeliama skausmą, pavyzdžiui, atsirandantį išsivysčius aftiniam stomatitui, aftinėms opoms, taip pat mažiems ortodontinių plokštelių ir netinkamai pritaikytų protezų sukeltiems pakenkimams. Purškalas taip pat tinka išplitusių aftinių opų atvejais.

Kaip veikia?

„Anaftin“® purškalo sudėtyje yra polivinilo pirolidono (PVP) ir hialurono rūgšties, sudarančių apsauginę plėvelę. Ji prilimpa prie burnos ertmės ir pažeistoms vietoms sudaro veiksmingą užtvartą, taip palengvindama dėl nervų galūnių dirginimo atsirandantį skausmą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis ir alavijai (*Aloe vera*) paspartina natūralų pakenktų audinių gijimą.

Vartojimo nurodymai

Priemonę vartodami pirmą kartą, nuimkite dangtelį ir uždėkite purkštuką. Purkštuką nukreipkite į burnoje esančią pažeistą vietą ir tris kartus arba tiek, kiek reikia, purškite priemonę, kad padengtumėte pažeistą plotą. Kad pasiektumėte geriausią rezultatą, pasipurškę priemonės mažiausiai 1 valandą nevalgykite ir negerkite. Purkštukas suteikia galimybę priemone padengti burnos pažeidimus ir užtikrinti stipriausią poveikį.

Purškite 3-4 kartus per dieną arba dažniau, jei reikia.

Sudėtyje yra:

vandens, propeno glikolio, polivinilo pirolidono (PVP), maltodekstrino, tikrojo alavijo (*Aloe barbadensis*), kalio sorbato, natrio

benzoato, PEG-40 hidrinto ricinos aliejaus, dinatrio EDTA, benzalkonio chlorido, natrio hialuronato, kvapiųjų medžiagų, natrio sacharino, dikalio glicirizato.

Išpėjimai

„Anaftin“® purškalo negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai. Jei esate nėščia, prieš vartodama priemonę, pasitarkite su gydytoju. Jei jus dažnai vargina burnos opos, rekomenduojama kreiptis medicininės pagalbos.

Išpėjimai ir atsargumo priemonės

Nevartokite, jei baigėsi galiojimo laikas arba jei atrodo, kad buteliukas pažeistas ar nesandarus. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikykite kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių. Neužšaldykite. Stenkitės, kad priemonės nepatektų į akis.

Turinys

15 ml

Gamintojas:

„Alliance Pharma Srl“,
Viale Restelli 5,
20124 Milan, Italija



Platintojas:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicker Weg 125,
12489 Berlynas, Vokietija

Peržiūrėta 2016 m. rugsėjo mėn.

LT / V109039/01
TR1188545
OSIN2FI0141E