

Alocclair[®] PLUS

BIOADHESIVE

bioadhezivní sprej

CZ

ÚLEVA OD BOLESTI PŘI AFTECH a DROBNÝCH PORANĚNÍCH V ÚSTECH

INDIKACE

Alocclair[®] Plus Bioadhesive bioadhezivní sprej působí mechanicky (vytváří bariéru) a je určený ke zvládnání příznaků způsobených aftami, ústní stomatitidou, vřidky v ústech, podrážděním ústní dutiny a drobnými poraněními ústní dutiny způsobených rovnátky a zubními protézami. Je vhodný zejména na obtížné přístupné afity a léze v ústech. Jeho působení vede k úlevě od bolesti tím, že přilne k povrchu ústní sliznice, zklidňuje léze v ústech, omezuje bolest a nepohodlí. Sprej obsahuje složky s vysokou filmotvornou schopností a vysokou mukoadhezi: vytváří ochranný film jako bariérový efekt (nebo štít), který vydrží déle než 10 hodin. Chrání před vnějšími vlivy a minimalizuje riziko dalšího dráždění. Sprej přilne k aftám i lézím, čímž omezí kontakt s vnějšími vlivy, jako jsou chemické, mechanické a tepelné podněty. Díky svému ochrannému působení pomáhá při zvládnání fyziologických procesů hojení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pro jednotlivé léze. Před prvním použitím přípravku odstraňte víčko a nasadte rozprašovač. Po řádné ústní hygieně nasměrujte rozprašovač směrem k lézi v ústech a stiskněte 2-4 krát, abyste pokryli postiženou oblast a vytvořili bariérový film. Alespoň 2 minuty se nedotýkejte jazykem poranění, aby se vytvořil ochranný film. Rozprašovač umožňuje co nejeefektivněji pokrýt přípravkem léze v ústech. Přípravek používejte 3-4krát denně nebo dle potřeby, dokud příznaky neodezní. Po třiceti dnech užívání aplikaci přerušte alespoň na jeden týden, než začnete aplikovat znovu. Pro nejlepší výsledky nejzte ani nepijte alespoň jednu hodinu po aplikaci.

SLOŽENÍ

AQUA, GLYCERIN, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, SODIUM CITRATE, POLYSORBATE 80, PVM/MA COPOLYMER, MALTODEXTRIN, PENTYLENE GLYCOL, GLUCONOLACTONE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PVP, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, POLYCARBOPHIL, XANTHAN GUM, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SUCRALOSE, AROMA, CALCIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE.

VAROVÁNÍ

Po každém použití pečlivě uzavřete uzávěr. Nejsou známy žádné vedlejší účinky z užívání přípravku. Tento přípravek je ale kontraindikován u pacientů s anamnézou přecitlivělosti na kteroukoliv ze složek přípravku. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc. Tento přípravek není určen k požití, ale k místní aplikaci do dutiny ústní. Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, neočekávají se žádné nepříznivé účinky. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo otevřený. Přípravek má být používán vždy jen jedním pacientem, aby se zabránilo křížové kontaminaci. Vyhněte se kontaktu s očima. Přípravek nebyl hodnocen během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před použitím s lékařem. Vhodné pro děti od 4 let.

UCHOVÁVÁNÍ

Doba použitelnosti se vztahuje na neporušený a správně uchovávaný přípravek. Uchovávejte v původním obalu na suchém místě, mimo dosah světla a zdrojů tepla. Neuchovávejte v chladničce. Uchovávejte při pokojové teplotě.

Velikost: 15 ml lahvička s přiloženým rozprašovačem

Zdravotnický prostředek

Poslední revize textů: 08.2023

Alocclair[®], Alliance a související označení jsou ochrannými známkami Alliance Pharma PLC Group[®].

 Biokosmes s.r.l.

Via Besana 10, 20122 Milano, Itálie

Distributor v ČR: NextForce a.s., Pardubická 528, 535 01 Chrudim, Česká republika

Symbol						
Význam	Základní výrobce zdravotnického prostředku	Označení CE od notifikovaného orgánu	Důležité informace naleznete v návodu k použití	Doba použitelnosti	Číslo šarže	Důležité informace naleznete v návodu k použití

 ALLIANCE

Alocclair[®] PLUS

BIOADHESIVE

bioadhezívny sprej

SK

CE 0477

ZMIERNENIE BOLESTI PRI AFTÁCH A DROBNÝCH PORANENIACH V ÚSTACH

INDIKÁCIE

Alocclair[®] Plus Bioadhesive bioadhezívny sprej pôsobí mechanicky (vytvára bariéru) a je určený na zvládnutie príznakov spôsobených aftami, ústnou stomatitídou, vriedkami v ústach, podráždením ústnej dutiny a drobnými poraneniami ústnej dutiny spôsobenými zubnými strojčkami a protézami. Je vhodný najmä na ťažko prístupné afty a lézie. Jeho pôsobenie vedie k úľave od bolesti tým, že prilne k povrchu ústnej sliznice, upokojí ústne lézie, obmedzí bolesť a nepohodlie. Sprej obsahuje zložky s vysokou filmotvornou schopnosťou a vysokou mukoadhéziou: vytvára ochranný film ako bariérový efekt (alebo štít), ktorý trvá viac ako 10 hodín. Chráni pred vonkajšími faktormi, čím minimalizuje riziko ďalšieho podráždenia. Sprej prilne k aftám aj léziám, čím obmedzuje kontakt s vonkajšími vplyvmi, ako sú chemické, mechanické a tepelné podnety. Vďaka svojmu ochrannému pôsobeniu pomáha pri zvládaní fyziologických procesov hojenia.

SPÔSOB POUŽITIA

Pre jednotlivé lézie. Pred prvým použitím odstráňte uzáver a nasadte rozprašovač. Po správnej ústnej hygiene nasmerujte sprej smerom k lézii v ústach a 2-4-krát stlačte, aby ste pokryli postihnuté miesto a vytvorili bariérový film. Nedotýkajte sa poranenia jazykom aspoň 2 minúty, aby sa vytvoril ochranný film. Rozprašovač vám umožní čo najefektívnejšie pokryť prípravkom lézie v ústach. Používajte 3-4-krát denne alebo podľa potreby, kým príznaky neodoznejú. Po tridsiatich dňoch používania prerušte aplikáciu aspoň na jeden týždeň, než začnete aplikovať znova. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nejedzte a nepite aspoň jednu hodinu po aplikácii.

ZLOŽENIE

AQUA, GLYCERIN, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, SODIUM CITRATE, POLYSORBATE 80, PVM/MA COPOLYMER, MALTODEXTRIN, PENTYLENE GLYCOL, GLUCONOLACTONE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PVP, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, POLYCARBOPHIL, XANTHAN GUM, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SUCRALOSE, AROMA, CALCIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE.

VAROVANIE

Po každom použití opatrne zatvorte uzáver. Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky vyplývajúce z používania produktu, avšak je kontraindikovaný u pacientov so známou anamnézou precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa príznaky zhoršujú, vyhľadajte lekársku pomoc. Prípravok nie je určený na požitie, ale na topickú aplikáciu do ústnej dutiny. Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu produktu, nepredpokladajú sa žiadne nepriaznivé účinky. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo otvorený. Produkt sa smie použiť len u jedného pacienta, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii. Zabráňte kontaktu s očami. Produkt nebol hodnotený počas tehotenstva a dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom. Vhodné pre deti od 4 rokov.

UCHOVÁVANIE

Dátum expirácie sa vzťahuje na neporušený, správne uchovávaný produkt. Uchovávajte v pôvodnom obale na suchom mieste, mimo dosahu svetla a zdrojov tepla. Neuchovávajte v chladničke. Uchovávajte pri izbovej teplote.

Veľkosť: 15 ml e fľaštička s priloženým rozprašovačom

Zdravotnícka pomôcka

Posledná revízia textov: 08.2023

Alocclair[®], Alliance a súvisiace označenia sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Alliance Pharma PLC Group[®].

Biokosmes s.r.l.

Via Besana 10, 20122 Milano, Taliansko

Distribútor v SR: NextForce a.s., Pardubická 528, 535 01 Chrudim, Česká republika

Symbol						
Význam	Zákonný výrobca zdravotníckej pomôcky	Značka zhody CE s číslom notifikovanej osoby 0477	Dôležité informácie nájdete v návode na použitie	Doba použiteľnosti	Číslo šarže	Dôležité informácie nájdete v návode na použitie

ALLIANCE

TR3031821 0ALL2FI00239