

Anaftin® Plus

Bioadhesive

bioadhezinis burnos skalavimo skystis



Burnos opų ir mažų burnos pažeidimų skausmo malšinimas

INDIKACIJA

Anaftin® Plus Bioadhesive bioadhezinis burnos skalavimo skystis veikia mechaniškai (barjerinis poveikis), jis skirtas aftinių opų, burnos stomatito, burnos žaizdelių, burnos dirginimo ir nedidelių, breketų ir protezų sukeltų burnos sužalojimų simptomams malšinti. Burnos skalavimo skystį ypač galima naudoti pasikartojančių opų atveju profilaktiniam ir apsauginiam poveikiui visoje burnos ertmėje. Jo veikimo mechanizmas padeda malšinti skausmą, priemonei prilipus prie burnos gleivinės paviršiaus, jis ramina burnos pažeidimus, mažina skausmą ir diskomfortą. Burnos skalavimo skysčio sudėtyje yra medžiagų, turinčių didelę galią plėvelei suformuoti, kurios labai gerai sukimba su gleivine. Jis sukuria apsauginę plėvelę kaip barjerą (arba skydą), kuri išlieka ilgiau nei 10 valandų. Jis apsaugo nuo išorinių veiksnių, sumažindamas tolesnio dirginimo riziką. Burnos skalavimo skystis prilimpa prie burnos opų ir pažeidimų, ribodamas sąlytį su išoriniais veiksniais, tokiais kaip cheminiai, mechaniniai ir terminiai dirgikliai. Dėl savo apsauginio poveikio jis padeda valdyti fiziologinį gijimo procesą.

KAIP NAUDOTI

Prieš naudojimą gerai pakratykite. Skalaukite burną su 15-20 ml (išmatuokite matavimo dangteliu) ne trumpiau kaip 1 minutę arba kuo ilgiau, kad gerai padengtumėte liežuvį, gomurį, skruostų vidų ir visus burnos audinius. Gargaliuokite ir išspjaukite. Vartokite 2-3 kartus per dieną arba pagal poreikį, geriausia po burnos higienos, kol simptomai išnyks. Po trisdešimties vartojimo dienų, prieš tęsdami gydymą nebevartokite bent vieną savaitę. Priemonė paruošta naudoti, neskieskite. Kad priemonės veiksmingumas būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite mažiausiai vieną valandą po panaudojimo.

SUDĖTIS

VANDUO, GLICERINAS, NATRIO CITRATAS, HIDRINTAS KRAKMOLO HIDROLIZATAS, POLISORBATAS 80, MALTODEKSTRINAS, PVM/MA KOPOLIMERAS, PENTILENGLIKOLIS, GLIUKONOLAKTONAS, KSANTANO LIPAI, PEG-40 HIDRINTAS RICINOS ALIEJUS, POLIVINILO PIROLIDONAS (PVP), NATRIO BENZOATAS, NATRIO

HIDROKSIDAS, ALIJOŠIAUS (ALOE BARBADENSIS) LAPŲ SULTYS, GLICERILKAPRILATAS/KAPRATAS, POLIKARBOFILAS, VAISTINĖS SVILAROŽĖS ŠAKNIES EKSTRAKTAS, NATRIO HIALURONATAS, SUKRALOZĖ, KVAPIOJI MEDŽIAGA, KALCIO GLIUKONATAS, KALIO SORBATAS.

ISPĖJIMAI

Kiekvieną kartą panaudoję kruopščiai uždenkite dangteliu. Nėra žinomų šalutinių poveikių, kuriuos sukeltų priemonės naudojimas, tačiau ji yra kontraindikuotina pacientams, kuriems anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai sudėtyje esančiai medžiagai. Jeigu simptomai išlieka ar pablogėja, kreipkitės į gydymo įstaigą. Priemonė neskirta nuryti. Ją reikia vartoti vietišškai burnos ertmėje. Atsitiktinai nurijus priemonės, nepageidaujamų poveikių nesitikima. Nenaudokite pasibaigus galiojimo terminui, kuris nurodytas ant pakuotės. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jeigu pakuotė yra pažeista arba atidaryta. Priemonę gali naudoti tik vienas pacientas, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo. Stenkitės, kad nepatektų į akis. Priemonė nebuvo vertinta nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Jeigu esate nėščia / žindote, prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju. Tinka vaikams nuo 4 metų amžiaus.

LAIKYMAS

Galiojimo terminas taikomas nepažeistai tinkamai laikomai priemonei. Laikykite gamintojo pakuotėje sausoje vietoje atokiai nuo šviesos ir šilumos šaltinio. Nelaikykite priemonės šaldytuve. Laikykite kambario temperatūroje.

Turinys: 120 ml  buteliukas su matavimo dangteliu (medicinos priemonė CE 0373).

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milan, Italija

Platintojas:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Vokietija

Peržiūrėta 2023-06

Simbolis		 0477				
Reikšmė	Medicinos priemonės teisėtą gamintoją	CE ženklas, išduotas notifikuotosios įstaigos	Svarbi informacija, žr. naudojimo instrukcijose	Galioja iki	Serijos numeris	Svarbi informacija, žr. naudojimo instrukcijose

TR2905013 0ALL2FI00179
LT / V109033/01