

# Alocclair® PLUS BIOADHESIVE

## Colutorio Bioadhesivo

### INDICACIONES

Alocclair® Plus Bioadhesive Colutorio Bioadhesivo presenta una acción mecánica (efecto barrera) indicada para el tratamiento de los síntomas causados por úlceras aftosas, estomatitis ulcerosa, llagas bucales, irritaciones bucales y pequeñas lesiones orales causadas por los aparatos de ortodoncia y las prótesis dentales. En concreto, el colutorio puede usarse en caso de úlceras de repetición, por sus acciones preventivas y protectoras en toda la cavidad bucal. Su mecanismo de acción produce un alivio del dolor al adherirse a la superficie de la mucosa bucal, calmando las lesiones orales y reduciendo el dolor y las molestias. El colutorio está formulado con ingredientes con alto poder mucoadhesivo y alta capacidad para crear una película protectora: crea un efecto barrera (o escudo) que dura más de 10 horas. Protege de los agentes externos, minimizando el riesgo de una mayor irritación. El colutorio se adhiere a las úlceras y lesiones bucales limitando el contacto con agentes externos como los estímulos químicos, mecánicos y térmicos. Gracias a su acción protectora, ayuda al control del proceso natural de cicatrización.

### INGREDIENTES

AQUA, GLYCERIN, SODIUM CITRATE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, POLYSORBATE 80, MALTODEXTRIN, PVM/MA COPOLYMER, PENTYLENE GLYCOL, GLUCONOLACTONE, XANTHAN GUM, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PVP, SODIUM BENZOATE, SODIUM HYDROXIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, POLYCARBOPHIL, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SUCRALOSE, AROMA, CALCIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE.

### INSTRUCCIONES DE USO

Agite bien antes de usar. Enjuague con 15-20 ml (utilice el tapón dosificador) por toda la boca durante, al menos, 1 minuto o durante tanto tiempo como sea posible para cubrir por completo la lengua, el paladar, el interior de las mejillas y todos los tejidos bucales. Haga gárgaras y escupa. Utilice 2-3 veces al día o según sea necesario, preferiblemente después de la higiene bucal, hasta que desaparezcan los síntomas. Tras treinta días de uso, interrumpa el tratamiento durante al menos una semana antes de reiniciarlo. El producto está listo para usar, no lo diluya. Para una mejor eficacia del producto, no coma ni beba durante, al menos, una hora después de la aplicación.

**ADVERTENCIAS** Vuelva a colocar el tapón con cuidado después de cada uso. No se conocen efectos adversos derivados del uso del producto; sin embargo, está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. Si los síntomas persisten, o en caso de que empeoren, consulte a su médico. El producto no se ha diseñado para ser ingerido, sino para su aplicación tópica en la cavidad bucal. En caso de ingestión accidental del producto, no se prevén efectos adversos. No utilice este producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilizar si el envase está dañado o abierto. El producto debe utilizarse en un solo paciente para evitar la contaminación cruzada. Evite el contacto con los ojos. El producto no ha sido evaluado durante el embarazo y la lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico antes de utilizarlo. Apto para niños a partir de 4 años.

### CONSERVACIÓN

La fecha de caducidad se refiere al producto intacto y correctamente almacenado. Conservar en el envase original, en un lugar seco y alejado de la luz y de las fuentes de calor. No refrigerar el producto. Conservar a temperatura ambiente.

**Presentación:** Frasco de 120 ml e con tapón dosificador (producto sanitario CE 0373).

Alocclair®, Alliance y dispositivos sanitarios asociados son marcas registradas del grupo Alliance Pharma PLC®.

Símbolo			0477			LOT	
Significado	Fabricante legal del producto sanitario	Marca CE del organismo notificado	Consulte información importante en las instrucciones de uso	Fecha de caducidad	Número de lote	Consulte información importante en las instrucciones de uso	

Biokosmes s.r.l.  
Via Besana 10,  
20122 Milano ITALY

ALLIANCE

ITALFARMACO s.a.

Rev: 03-2023

211296/07  
0ALL2FI00168 TR2833692

Distribuido en España por:  
Italfarmaco S.A.  
San Rafael, 3  
28108 Alcobendas  
(Madrid)