

Anaftin® PlusBioadhesive

Bioadhezyjny żel

Ulga w bólu związanym z owrzodzeniami i małymi zmianami w jamie ustnej

WSKAZANIE:
Anaftin® Plus Bioadhesive bioadhezyjny żel ma działanie mechaniczne (efekt bariery) i stosowany jest w leczeniu objawów spowodowanych owrzodzeniami aftowymi, zapaleniem jamy ustnej, owrzodzeniami jamy ustnej, podrażnieniami jamy ustnej i drobnymi urazami jamy ustnej spowodowanymi aparatami ortodontycznymi i protezami zębowymi. Jego mechanizm działania powoduje ulgę w bólu poprzez przyleganie do powierzchni śluzówki w jamie ustnej, łagodzenie zmian, zmniejszenie bólu i dyskomfortu. Z uwagi na swoją konsystencję oraz specjalny aplikator Anaftin® Plus Bioadhesive bioadhezyjny żel jest szczególnie wskazany w przypadku wyraźnie widocznych i dostępnych zmian. Żel zawiera wysoce mukoadhezyjne składniki o dużej zdolności filmotwórczej: tworzy on warstwę ochronną stanowiącą barierę (lub tarczę), która utrzymuje się ponad 12 godzin. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi, minimalizując ryzyko dalszych podrażnień. Żel pokrywa owrzodzenia i zmiany w jamie ustnej, ograniczając kontakt z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak bodźce chemiczne, mechaniczne i termiczne. Dzięki działaniu ochronnemu wspomaga fizjologiczny proces gojenia.

SPOSÓB UŻYCIA:
Do małych pojedynczych zmian. Po umyciu zębów nałożyć 1 lub 2 krople żelu na całe owrzodzenie lub całą zmianę w jamie ustnej. Unikać bezpośredniego kontaktu aplikatora ze zmianą chorobową. Jeśli zmiana jest trudno dostępna, żel należy nakładać czystym palcem lub gazikiem. Nie dotykać zmiany językiem przez co najmniej 2 minuty, aby umożliwić powstanie warstwy ochronnej. Po każdym użyciu zamknąć nakrętkę. Stosować 3–4 razy na dobę lub w razie potrzeby, aż do ustąpienia objawów. Po trzydziestu dniach stosowania odstawić na co najmniej tydzień przed wznowieniem leczenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy jeść ani pić przez co najmniej godzinę po zastosowaniu.

SKŁAD:
Woda, uwodorniony hydrolizat skrobi, gliceryna, PVP, cytrynian sodu, polisorbat 80, kopolimer PVM/MA, maltodekstryna, guma ksantanowa, glikol pentylenowy, glukonolakton, wodorotlenek sodu, PEG-40

uwodorniony olej rycynowy, hialuronian sodu, benzoesan sodu, sok z liści aloesu zwyczajnego, kaprylan glicerylu, polikarbofil, wyciąg z korzenia Althaea officinalis, sukraloza, aromat, glukonian wapnia, sorbinian potasu.

OSTRZEŻENIA:
Po każdym użyciu ostrożnie zamknąć nakrętkę. Nie są znane żadne działania niepożądane wynikające ze stosowania tego produktu, jednak jest on przeciwwskazany u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników. Jeśli objawy będą się utrzymywać lub się nasilać, należy zasięgnąć porady lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia, lecz do stosowania miejscowego w jamie ustnej. W razie przypadkowego połknięcia produktu nie przewiduje się wystąpienia żadnych działań niepożądanych. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte. Produkt powinien być używany przez jedną osobę, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Unikać kontaktu z oczami. Stosowanie produktu nie zostało ocenione w czasie ciąży i karmienia piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu. Produkt odpowiedni dla dzieci od 4 roku życia.

PRZECHOWYWANIE:
Termin ważności odnosi się do nienaruszonego, prawidłowo przechowywanego produktu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od światła i źródeł ciepła. Nie przechowywać produktu w lodówce. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Wielkość: tubka **8 ml** 
 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10, 20122 Milan, Włochy

Dystrybutor:
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji: 06-2023

Symbol		 0477				
Znaczenie	Legalny producent wyrobów medycznych	Znak CE nadany przez jednostkę notyfikowaną	Zapoznać się z instrukcją użycia, aby uzyskać ważne informacje	Termin ważności	Numer serii	Zapoznać się z instrukcją użycia, aby uzyskać ważne informacje

OALL2F100181
TR2902680
PL / V109407/01