

Instrukcja użycia



Anaftin® Spray

Anaftin® Spray łagodzi dolegliwości bólowe wywołane przez niewielkie zmiany w jamie ustnej, takie jak aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe, jak również zmiany wywołane przez aparaty ortodontyczne i źle dopasowane protezy. Jest również wskazany do stosowania w przypadku rozległych owrzodzeń aftowych.

Sposób działania:

Anaftin® Spray zawiera poliwinylpirolidon (PVP) i kwas hialuronowy, które tworzą ochronną warstwę pokrywającą jamę ustną, stanowiącą barierę mechaniczną dla uszkodzonych okolic, i dzięki temu łagodzi ból wywołany podrażnieniem odsłoniętych zakończeń nerwowych. Zawarte w składzie kwas hialuronowy i aloes wspomagają naturalny proces gojenia uszkodzonych tkanek.

Instrukcja użycia:

Przed pierwszym użyciem zdejmij nakrętkę i nałóż dozownik. Skieruj dozownik na zmianę w jamie ustnej i naciśnij 3 razy lub tyle, ile jest konieczne, aby pokryć zmianę. Dla uzyskania najlepszego rezultatu nie należy jeść i pić przez co najmniej godzinę po zastosowaniu. Dozownik pozwala na pokrycie produktem zmiany w jamie ustnej w sposób zapewniający jak najlepszy rezultat.

Stosuj 3–4 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby.

Skład:

Glikol propylenowy, poliwinylpirolidon (PVP), maltodekstryna, aloes zwyczajny (*Aloe barbadensis*), sorbinian potasu, benzoesan sodu, PEG-40 olej rycynowy uwodniony, wersenian disodu (EDTA), chlorek benzalkonium, hialuronian sodu, aromat,

sacharynian sodu, dwupotasowa sól kwasu glicyryzynowego, woda.

Uwaga:

Stosowanie produktu Anaftin® Spray jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników. W przypadku ciąży przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza. W przypadku częstych nawrotów owrzodzeń jamy ustnej wskazana jest konsultacja lekarska.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie stosować po upływie terminu ważności lub w przypadku uszkodzenia lub nieszczelności butelki. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródła ciepła. Nie zamrażać. Unikać kontaktu z oczami.

Zawartość:

15 ml

Wytwórca:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milan, Włochy



Dystrybutor:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicker Weg 125,
12489 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji: 09/2016

TR1197257
OSIN2FI0160E
PL / V109414/01