

Anaftin® Plus

Bioadhesive

BERLIN-CHEMIE

MENARINI

Bioadhezyjny spray

Ulga w bólu związanym z owrzodzeniami i małymi zmianami w jamie ustnej

WSKAZANIE:
Anaftin® Plus Bioadhesive bioadhezyjny spray ma działanie mechaniczne (efekt bariery) i stosowany jest w leczeniu objawów spowodowanych owrzodzeniami aftowymi, zapaleniem jamy ustnej, owrzodzeniami jamy ustnej, podrażnieniami jamy ustnej i drobnymi urazami jamy ustnej spowodowanymi aparatami ortodontycznymi i protezami zębowymi. Jest szczególnie wskazany w przypadku owrzodzeń i trudno dostępnych zmian w jamie ustnej. Jego mechanizm działania powoduje ulgę w bólu poprzez przyleganie do powierzchni śluzówki w jamie ustnej, łagodzenie zmian, zmniejszenie bólu i dyskomfortu. Spray zawiera wysoce mukoadhezyjne składniki o dużej zdolności do tworzenia filmu. Tworzy on warstwę ochronną stanowiącą barierę (lub tarczę), która utrzymuje się ponad 10 godzin. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi, minimalizując ryzyko dalszych podrażnień. Spray pokrywa owrzodzenia i zmiany w jamie ustnej, ograniczając kontakt z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak bodźce chemiczne, mechaniczne i termiczne. Dzięki działaniu ochronnemu wspomaga fizjologiczny proces gojenia.

SPOSÓB UŻYCIA:
Do pojedynczych rozlanych zmian. Przed pierwszym użyciem zdjąć nakrętkę i nałożyć dozownik. Po poprawnej higienie jamy ustnej skierować dozownik na zmianę w jamie ustnej i nacisnąć 2–4 razy, aby pokryć obszar zmieniony chorobowo i stworzyć warstwę barierową. Nie dotykać zmiany językiem przez co najmniej 2 minuty, aby umożliwić powstanie warstwy ochronnej. Dozownik umożliwia pokrycie zmian w jamie ustnej z maksymalną skutecznością. Stosować 3-4 razy na dobę lub w razie potrzeby, aż do ustąpienia objawów. Po trzydziestu dniach stosowania odstawić na co najmniej tydzień przed wznowieniem leczenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy jeść ani pić przez co najmniej godzinę po zastosowaniu.

SKŁAD:
Woda, gliceryna, uwodorniony hydrolizat skrobi, cytrynian sodu, polisorbat 80, kopolimer PVM/MA, maltodekstryna, glikol pentylenowy, glukonolakton, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy, PVP, wodorotlenek sodu, benzoesan sodu, sok z liści aloesu

zwyčajnego, kaprylan glicerylu, polikarbofil, guma ksantanowa, wyciąg z korzenia Althaea officinalis, hialuronian sodu, sukraloza, aromat, glukonian wapnia, sorbinian potasu.

OSTRZEŻENIA:
Po każdym użyciu ostrożnie zamknąć nakrętkę. Nie są znane żadne działania niepożądane wynikające ze stosowania tego produktu, jednak jest on przeciwwskazany u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników. Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać się, należy zasięgnąć porady lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia, lecz do stosowania miejscowego w jamie ustnej. W razie przypadkowego połknięcia produktu nie przewiduje się wystąpienia żadnych działań niepożądanych. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte. Produkt powinien być używany przez jedną osobę, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Unikać kontaktu z oczami. Stosowanie produktu nie zostało ocenione w czasie ciąży i karmienia piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu. Produkt odpowiedni dla dzieci od 4 roku życia.

PRZECHOWYWANIE:
Termin ważności odnosi się do nienaruszonego, prawidłowo przechowywanego produktu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od światła i źródeł ciepła. Nie przechowywać produktu w lodówce. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Wielkość: butelka **15 ml**  z dołączonym dozownikiem.

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10, 20122 Milan, Włochy

Dystrybutor:
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji: 06-2023

Symbol						
Znaczenie	Legalny producent wyrobów medycznych	Znak CE nadany przez jednostkę notyfikowaną	Zapoznać się z instrukcją użycia, aby uzyskać ważne informacje	Termin ważności	Numer serii	Zapoznać się z instrukcją użycia, aby uzyskać ważne informacje

TR2904854
OALL2FI00182
PL / V109414/01